


**Voorbeelden van levenscycli en de overwinteringsfases van diverse dagvlindersoorten
Ter ondersteuning van de cursus over wilde bijen en vlinders en hun planten en beheer**

Tekst en foto's: © Wankja Ferguson www.vlindererbij.nl
Tekeningen: ©Kitty Blum www.kittyblumcards.nl



zwartsprietdikkopje

voorjaar.....voorjaar rupspop... zomer, juni, juli pop, vlinder.....ei afzet.....herfst..... winter...



In het voorjaar (april) komen de jonge rupsjes van het **zwartsprietdikkopje** uit het ei en eten van de jonge scheuten van het gras. De poppen verpoppen nabij de grond meestal aan de basis van de waardplanten voordat de vlinder in juni weer gaat vliegen en weer opnieuw eitjes gaat afzetten.

©Kitty Blum



Het volgende jaar kan je dan het deel van het gras wat je dit jaar tot juni hebt laten staan juist wél maaien, dan voorkom je boomopslag. En een deel van het grasland of bloemenweide die je het jaar ervoor juist wél hebt gemaaid maai je dan niet. Zo kan de vlinder opnieuw haar cyclus voltooien. Dát is het principe van gefaseerd maaien.



Vanaf juni worden er eitjes afgezet in het gras, vaak hoog in de plant. Hoger dan 15 cm. boven maaiveld. De overwinteringsfase van deze vlinder is als eitjes (of ini-mini rupsjes in het gras).


Dat betekent dat er een deel van het gras in het najaar niet gemaaid kan worden wil je deze vlinder een kans geven op voortplanting.

De vlinder heeft een juni-juni cyclus.



Geelsprietdikkopje, zomer, juni, juli.....herfst.....winter

Voorbeeld van de tijden van het jaar dat de stadia: de eitjes, de rupsen en de poppen van **het geelsprietdikkopje (*Thymelicus sylvestris*)** zich in de vegetatie bevinden



Provincies waar ze in voorkomt:

gr	fr	dr	ov	gl	ut	nh	zh	ze	br	li									
gr	fr	dr	ov	gl	ut	nh	zh	ze	br	li	fl	voor 1981							


Komt door het hele land voor

Gebruikt:

Diverse breedbladige grassoorten die al in het voorjaar voedzame scheuten hebben, zoals geknikte vossesstaart, gestreepte witbol, gladde witbol, timoteegrass en pijpenstrootje.




Het is daarbij belangrijk je te realiseren dat het piepkleine rupsjes zijn die ingesponnen in een coconnetje overwinteren ingeklemd tussen de grasbladeren




K. Blum

Het **geelsprietdikkopje** overwintert als ini-mini rupsje in een coconnetje ingeklemd tussen de blaadjes van het gras



In het voorjaar zit het kleine rupsje
Ingesponnen in het gras en eet van de verse


blaadjes, ook de oudere rups doet dat



Vlak voordat het weer
een nieuwe vlinder
wordt verpopt de rups
zich meestal ergens
onder aan de waardplant



Ergens in juni
gaat de vlinder
weer vliegen.
Ze is gek op nectar
van veel bloemen.
Ze wil dus bloemrijk
grasland.



Vanaf juni zet ze
Haar eitjes af
In de schedes van
grasbladeren.
De eitjes en zéér
jonge rupsjes zitten
Ingeklemd.
Zo gaat de vlinder
de winter weer in.

Ze heeft dus grasland nodig wat in de herfst niet gemaaid wordt. Ze heeft een juni-juni cyclus. Ze is iets meer vochtminnend, Ze is dan ook vaak in een iets vochtiger omgeving te vinden dan het zwartsprietdikkopje.




mei.....klaverblauwtje.....ei afzet vanaf mei gedurende de hele zomer.....sept.. tot soms begin herfst

ei wordt afgezet op *verse* bloemhoofdjes van de rode klaver, soms wondklaver

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)

Provincies waarin ze voorkomt :										li	klaverblauwtje
gr	ov	gl	ut	nh	zh	ze	br	li	voor 1981		

Klaverblauwtje





Het klaverblauwtje zet de eitjes af op de nog net niet geopende zéér jonge bloemen van de rode klaver.
Het rupsje zal nooit groot worden als de eitjes niet op héél verse Klaver wordt afgezet.

eitjes



De rupsen eten van de bloemen en zaden van de rode klavers. (Kan ook wondklaver zijn)

KBlum

Het klaverblauwtje

heeft meerdere generaties per jaar.
Ze is dus vanaf mei verder vrijwel het hele jaar op zoek naar verse rode klaver bloemen.

Het is dus van belang niet alle bloemen af te maaien



KBlum


Klaverblauwtje mannetje



De poppen verpoppen nabij de grond




Het boswitje




Voorbeeld van de tijden van het jaar dat de stadia: de eitjes, de rupsen en de poppen van **het boswitje (Leptidea sinapsis)** zich ín de vegetatie bevinden

Waardplanten o.a. : vogelwikke, veldlathyrus, rolklaver, moerasrolklaver



De eitjes worden bij de *top* van de waardplant afgezet
De rupsen vanaf het derde stadium gaan van de *jonge* spruiten van de plant eten, *bovenin* de plant
De pop gaat op een *ándere* plant dan de waardplant hangen, gras, bies of roos bijv. op een hoogte tussen de *10-70* cm.

In álle fases, ei, rups, pop bevindt de vlinder zich hóóg in de vegetatie. Daaruit volgt dat deze vlinder zéér maaigevoelig is. D.w.z. dat ze ruigtes, vaak meerjarig nodig heeft en écht ongemaaide delen in de vegetatie, waarbij zowel de waardplanten áls de planten waarop ze overwinterd, wat vaak grassen, biesjes of stengels van andere kruidachtige planten zijn gespaard worden. Het boswitje heeft heeft ook graag een vochtige omgeving, die vaak bij bosranden wel te vinden is.




Ruimte voor de levenswijze van het zeldzame Boswitje
Let goed op de hoogtes tijdens stadia van ontwikkeling

- 1-Eitjes: Top plant ..
- 2-Rups: Het verse toppen van de plant
- 3 Pop: Tussen 10 en 70 cm

4 Vlinder:

Vliegafstand:





Voor het oranje tipje, die haar eitjes afzet op o.a., de pinksterbloem en de rupsen de hauwtjes eten die daarna als pop in de dichtstbijzijnde struiken hangt is het iets makkelijker dan voor het boswitje. De struiken worden minder vaak gesnoeid. Het is oppassen dat de pinksterbloemen niet te snel gemaaid worden omdat de rups de hauwtjes eet. Eenmaal hangend als pop in de struiken is de vlinder redelijk safe.



Voorbeeld van de tijden van het jaar dat de stadia: de eitjes, de rupsen en de poppen van **het oranje tipje (Anthocharis cardamines)** zich ín de vegetatie bevinden

Provincies waar deze vlinder in voorkomt:

gr	fr	dr	ov	gl	ut	nh	zh	ze	br	li	fl	
gr	fr	dr	ov	gl	ut	nh	zh	ze	br	li		voor 1981

				maanden													

De sleedoornpage





De sleedoornpage is een vlinder die als eitje in een oksel van een tak en een jonge tak of knop van de sleedoorn overwinterd. Hier staan twee collega's te kijken of ze per ongeluk de eitjes zien zitten in de sleedoorn in een sleedoorn bosschage.

[illegible]

voorkomen in provincies:

	fr	dr	ov	gl	ut	nh			br	li	fl	
<i>gr</i>		<i>dr</i>	<i>ov</i>	<i>gl</i>	<i>ut</i>	<i>nh</i>	<i>ze</i>	<i>br</i>	<i>li</i>		<i>voor 1981</i>	

achteruitgaand !

Omdat de sleedoornpage als eitje overwinterd en in het voorjaar van de knoppen van het blad eet is het van belang de sleedoorn gefaseerd te snoeien. Dat wil zeggen: altijd *minstens een deel* van de sleedoorn bosschages laten staan dus ongemoeid laten en dan dat deel misschien in een ander jaar snoeien. !!

In fases snoeien dus !

Bronnen:

Bink F. et al. 2013, Dagvlinders in de Benelux.

Bos F. et al. 2006 Dagvlinders van Nederland

De Vlinderstichting. Soort beschrijvingen van de site van de vlinderstichting

Eeles P, 2019, Life Cycles of British and Irish Butterflies

NDFF, verspreidingsatlas